

Composition:

ChiroCvstTM 500mg Capsule: Each capsule contains D-chiro-inositol 500mg standardized extract.

Description:

D-chiro-inositol is extracted by a patented process from Carob (Ceratonia siliqua) pod that mostly found in Southern Europe. Deficiency of D-chiro-inositol in peripheral tissue causes insulin resistance that leads to hyperandrogenism in ovaries which results polycystic ovary syndrome (PCOS). D-chiro-inositol helps to regulate the balance between androgen and estrogen by decreasing luteinizing hormone and serum testosterone level. It improves glucose tolerance and reduces circulating insulin. It reduces oxidative stress on follicle and decreases total cholesterol and triglyceride levels. D-chiro-inositol has been clinically proven as an effective treatment of ovarian cyst and PCOS associated metabolic disorders. It helps to improve and regulate normal ovulation after two weeks of administration. It also reduces hyperandrogenism related skin disorders like hirsutism, alopecia, acanthosis nigricans and acne. It lowers cardiovascular risk in women who are suffering from PCOS by controlling arterial pressure.

Indications and Uses:

ChiroCystTM capsule is indicated for the treatment and prevention of-

- Polycystic ovary syndrome (PCOS)
- Annyulation
- Menstrual disorders such as amenorrhea
- Hvperandrogenism complaints such as hirsutism. alopecia, acanthosis nigricans, acne
- Ovarian hyperthecosis

Dosage and Administration:

Orally 1-2 capsules daily or as advised by the physician.

Duration of Use:

Duration of the treatment should be minimum 2 months

Contraindication:

Contraindicated in patient with known hypersensitivity to D-chiro-inositol.

Pregnancy and Lactation:

Several human studies have been conducted with inositol has no clinically relevant adverse effects.

Side Effects:

Well tolerated in recommended dose.

Drug Interactions:

Concurrent use with digoxin may result in increased digoxin toxicity.

Storage:

Store at temperature of below 30°C, protect from light & moisture.

Keep out of reach of children.

Nutritional facts

Serving per size: 1 capsule (500mg)

Serving per box: 14 capsules

	Amount Per Serving	Amount Per Box
Energy Value	1.9 Cal	26.6 Cal
Proteins	0 mg	0 mg
Carbohydrates	≥ 0.475 mg	≥ 6.65 mg
Sugars	≥ 0.475 mg	≥ 6.65 mg
Total Fat	0 mg	0 mg
Saturated Fat	0 mg	0 mg
Trans Fat	0 mg	0 mg
Fiber	0 mg	0 mg
Mineral (Sodium)	≤ 0.01 mg	≤ 0.14 mg

Packs:

ChiroCvstTM 500mg Capsule: Each box contains 2x7 capsules in Alu-Alu blister pack.

TM: Trade Mark



RADĬANT NUTRACEUTICALS

Manufactured by

Radiant Nutraceuticals Ltd. (Herbal Division)

B-34, BSCIC Industrial Estate Tongi, Gazipur, Bangladesh





উপস্থাপনঃ

কায়রোসিস্ট™ ৫০০ মিগ্রা ক্যাপসূলঃ প্রতিটি ক্যাপসূলে আছে ডি-কায়রো-ইনোসিটল ৫০০ মিগ্রা স্ট্যান্ডার্ডাইজড নির্যাস।

বিবরণঃ

ডি-কায়রো-ইনোসিটল একটি পেটেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দক্ষিণ ইউরোপের ক্যারব (সেরাটোনিয়া সিলিক্য়া) নামক উদ্ভিদ এর শুঁট থেকে নির্যাসকত। পেরিফেরাল টিস্যুতে ডি-কায়রো-ইনোসিটলের ঘাটতি দেখা দিলে ইনস্লিন প্রতিরোধের সৃষ্টি হয় যার ফলে ডিম্বাশয়ের কোষে হাইপারঅ্যান্ডোজেনিজম হয় যা পলিসিস্টিক ওভারি সিন্দ্রোম (পিসিওএস) এর সমস্যা সষ্টি করতে পারে। ডি-কায়রো-ইনোসিটল লুটিনাইজিং হরমোন এবং রক্তরসে টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ কমিয়ে শরীরে এন্ডোজেন ও ইস্টোজেনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি রক্তে সঞ্চালিত ইনসূলিনের পরিমাণ কমায় এবং গ্রকোজের প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে। ডিম্বকোষের উপর অক্সিডেটিভ স্টেস কমায় এবং শরীরে টোটাল কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্রিসারাইডের মাত্রা কমায়। ওভারিতে সষ্ট সিষ্ট এবং পলিসিস্টিক ওভারি সিনডোম সম্বন্ধীয় বিপাকীয় সমস্যার ক্ষেত্রে ডি-কায়বো-ইলোসিটল একটি কার্যকবী চিকিৎসা হিসেবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমানিত। এটি সেবনের দুই সপ্তাহ পর ডিম্বনিঃসরণের সম্ভাবনা বদ্ধি করে। এটি হাইপারঅ্যান্ড্রোজেনিজম জনিত বিভিন্ন তুকের সমস্যা যেমন মখে অস্বাভাবিক লোমের আধিক্য, কেশ বিরলতা, রণ এবং তকের বিভিন্ন অংশে যেমন ঘাড, কপাল ও অন্যান্য স্থানে বাদামী থেকে কালো দাগ হয়ে যাওয়া কমাতে সাহায্য করে। যে সকল মহিলা পিসিওএস এর সমস্যায় ভগছেন তাদের ক্ষেত্রে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হৃদরোগের ঝঁকি কমায়।

নির্দেশনা ও ব্যবহাবঃ

কায়রোসিস্ট্রা ক্যাপসূল যে সকল রোগের চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে নির্দেশিত-

- 💗 পলিসিস্টিক ওভারি সিন্দ্রোম (পিসিওএস)
- ি ডিম্বনিঃসরণ না হওয়া বা আানোভলেশন
- অনিয়মিত বা অনেকদিন পর পর মাসিক হওয়া বা আমেনোরয়া
- হাইপারআ্যান্ড্রোজেনিজম জনিত বিভিন্ন ত্রকের সমস্যা যেমন মুখে অস্বাভাবিক লোমের আধিক্য, কেশ বিরলতা, ব্রণ এবং ত্রকের বিভিন্ন অংশে যেমন ঘাড়, কপাল ও অন্যান্য স্থানে বাদামী থেকে কালো দাগ হওয়া
- 🕡 ওভারিয়ান হাইপারথেকসিস

সেবনবিধিঃ

প্রতিদিন ১-২টি ক্যাপসুল সেব্য অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দেশিত।

সেবনের স্থিতিকালঃ

সেবনের স্থিতিকাল কমপক্ষে ২ মাস।

প্রতিনির্দেশনাঃ

যে সকল রোগীদের ডি-কায়রো-ইনোসিটল এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহারঃ

ইনোসিটল এর উপর সংগঠিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াঃ

নির্দেশিত মাত্রায় ডি-কায়রো-ইনোসিটল শরীরের জন্য সহনশীল।

পৃষ্টিগুণ সম্পর্কিত তথ্য

প্রতি পরিবেশনে পরিমাণ: ১টি ক্যাপসূল (৫০০মিগ্রা) প্রতি বাক্সে পরিমাণ: ১৪টি ক্যাপসূল

	প্রতি পরিবেশনে পরিমাণ	প্রতি বাক্সে পরিমাণ
ক্যালরি	১.৯ ক্যাল	২৬.৬ ক্যাল
প্রোটিন	০ ক্যাল	০ ক্যাল
কার্বোহাইড্রেট	≥ ০.৪৭৫ মিগ্ৰা	≥ ৬.৬৫ মিগ্ৰা
সুগার	≥ ০.৪৭৫ মিগ্ৰা	≥ ৬.৬৫ মিগ্ৰা
মোট ফ্যাট	০ মিগ্ৰা	০ মিগ্ৰা
স্যাচুরেটেড ফ্যাট	০ মিগ্ৰা	০ মিগ্ৰা
ট্রান্স ফ্যাট	০ মিগ্ৰা	০ মিগ্ৰা
খাদ্য আঁশ	০ মিগ্ৰা	০ মিগ্ৰা
মিনারেল (সোডিয়াম)	≤ ০.০১ মিথা	≤ ০.১৪ মিগ্রা

অন্য ওষুধের সাথে ক্রিয়াঃ

ডিগক্সিনের সাথে সহব্যবহারের ক্ষেত্রে ডিগক্সিনের বিষক্রিয়া বৃদ্ধি পেতে পারে।

সংরক্ষণঃ

আলো এবং আর্দ্রতা থেকে দূরে, ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ করুন।

সকল ওম্বধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখন।

সরবরাহঃ

কায়রোসিস্ট $^{\text{TM}}$ ৫০০মিগ্রা ক্যাপসূলঃ প্রতিটি বাব্দ্রে রয়েছে ২ χ ৭টি ক্যাপসূল অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

TM: ট্রেডমার্ক



এখানে মোবাইলের স্ক্যানার ধরুন



প্রস্তুতকারক রেডিয়েন্ট নিউট্রাসিউটিক্যাল্স লিমিটেড (হারবাল ডিভিশন) বি ১৯০ বিশিক্ষ জিল নুল্যী

বি-৩৪, বিসিক শিল্প নগরী টঙ্গী, গাজীপুর, বাংলাদেশ