

**V** 20/06/2019 - AN
Code article : 757637



**Format à plat :**

**150 x 352 mm**

**Sanofi Pasteur**
**Pays : XFAE**

**Format plié :**

**MLE : 150 x 23 mm**
**VDR : NA**

## I Référence Pantone U : Black



**Hexaxim**

**Suspension injectable en seringue préremplie**

**Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellular, multicomposé), de l'hépatite B (ADNr), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de l'*Haemophilus influenzae* type b, adsorbé**

<p><b>Veillez lire attentivement cette notice avant de faire vacciner votre enfant car elle contient des informations importantes pour lui.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"><li>Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.</li> <li>Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.</li> <li>Si votre enfant présente un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubriques 4.</li></ul>

**Que contient cette notice :**

- Qu'est-ce qu'HEXAXIM et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant qu'HEXAXIM ne soit administré à votre enfant
- Comment utiliser HEXAXIM
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver HEXAXIM
- Contenu de l'emballage et autres informations

**1. Qu'est-ce qu'HEXAXIM et dans quel cas est-il utilisé ?**

HEXAXIM (DTPaP-IPV-Hb-Hib) est un vaccin utilisé pour se protéger contre les maladies infectieuses. HEXAXIM contribue à protéger contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et les maladies graves à *Haemophilus influenzae* type b. HEXAXIM peut être donné aux enfants dès l'âge de six semaines.

Le vaccin agit de manière à ce que le corps développe sa propre protection (anticorps) contre les bactéries et virus responsables des maladies suivantes :

- La diphtérie, maladie infectieuse qui commence généralement par toucher la gorge, provoquant des douleurs et un gonflement pouvant entraîner une suffocation. La bactérie responsable de la maladie produit également une toxine (poison) pouvant endommager le cœur, les reins et les nerfs.
- Le tétanos, généralement causé par la pénétration de la bactérie du tétanos par une plaie profonde. La bactérie produit une toxine (poison) qui provoque des spasmes musculaires entraînant une incapacité à respirer et un risque de suffocation.
- La coqueluche est une maladie hautement infectieuse qui touche les voies respiratoires. Elle provoque une toux sévère susceptible de provoquer des difficultés à respirer. Cette toux ressemble au bruit que fait le cou lorsqu'il chante. La toux peut persister pendant un à deux mois, se voir plus longtemps. La coqueluche peut aussi provoquer des infections des oreilles, des infections des bronches (bronchite) qui peuvent durer longtemps, des infections pulmonaires (pneumonie), des convulsions, des lésions cérébrales et même le décès.
- L'hépatite B est provoquée par le virus de l'hépatite B. Elle entraîne un gonflement du foie (une inflammation). Chez certaines personnes, le virus peut subsister dans le corps pendant longtemps et il peut finir par entraîner de graves problèmes de foie, y compris un cancer du foie.
- La poliomyélite (souvent appelée polio), causée par des virus qui affectent les nerfs. La poliomyélite peut entraîner la paralysie ou une faiblesse musculaire, le plus souvent des jambes. La paralysie des muscles contitant la respiration et la déglutition peut être fatale.
- Les infections à *Haemophilus influenzae* type b (souvent appelé Hib), infections bactériennes graves pouvant entraîner une méningite (inflammation de l'enveloppe externe du cerveau) susceptible d'entraîner des lésions cérébrales, une surdité, une épilepsie ou rendre particulièrement aveugle. L'infection peut provoquer une inflammation et un gonflement de la gorge entraînant des difficultés à avaler ou à respirer. L'infection peut toucher d'autres parties du corps comme le sang, les os, le cerveau, les reins et les articulations.

**Informations importantes concernant la prévention et le contrôle**

- HEXAXIM aide à prévenir ces maladies uniquement si elles sont causées par les bactéries ou les virus ciblés par le vaccin. Votre enfant peut attraper des maladies dont les symptômes sont similaires, si elles sont dues à d'autres bactéries ou à d'autres virus.
- Ce vaccin ne contient pas de bactérie vivante ou de virus vivant et ne peut pas provoquer les maladies infectieuses contre lesquelles il protège.
- Ce vaccin ne protège pas contre les infections invasives dues à d'autres types de *Haemophilus influenzae*. Il ne protège pas contre les méningites causées par d'autres micro-organismes.
- HEXAXIM ne protège pas contre les infections hépatiques causées par d'autres agents pathogènes, telles que ceux de l'hépatite A, l'hépatite C, l'hépatite E.
- Étant donné que les symptômes de l'hépatite B se développent lentement, il est possible qu'une infection non détectée soit présente lors de la vaccination. Dans ce cas, il se peut que le vaccin ne protège pas contre l'hépatite B.
- Comme pour tout autre vaccin, HEXAXIM ne peut pas garantir la protection de 100 % des enfants vaccinés.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant qu'HEXAXIM ne soit administré à votre enfant ?**

Pour être sûr qu'HEXAXIM convient bien à votre enfant, il est important de dire à votre médecin ou à votre infirmier/ère si l'un des cas ci-dessous s'applique à votre enfant. S'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère si vous en avez besoin.

- Vous avez une maladie infectieuse ou**
  - a présenté un trouble respiratoire ou un gonflement du visage (réaction anaphylactique) après l'administration d'HEXAXIM.
  - a eu une réaction allergique -aux substances actives,

-à l'un des excipients mentionnés dans la rubrique 6, -al glutaraldéhyde ou formaldéhyde, à la néomycine, à la streptomycine ou à la polymyxine B, ces substances étant utilisées pendant le procédé de fabrication.

- suite à une précédente administration d'HEXAXIM ou d'autres vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, l'hépatite B ou vaccins Hib.
- a souffert d'une réaction allergique touchant le cerveau (encéphalopathie) dans les 7 jours suivant une précédente administration d'une dose de vaccin coquelucheux (acellulaire ou à germes entiers).
- a une maladie non contrôlée ou une maladie grave touchant le cerveau (troubles neurologiques non contrôlés) ou souffert d'une épilepsie non contrôlée.

**Avertissements et précautions**

Avant la vaccination, adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère si votre enfant :

- présente une température modérée ou élevée ou une maladie aiguë (par ex., fièvre, mal de gorge, toux, rhume ou grippe). Il est possible que la vaccination par HEXAXIM doive être reportée jusqu'à ce que votre enfant se sente mieux.
- présentent l'un des événements suivants après l'administration d'un vaccin coquelucheux car la décision d'administrer d'autres doses de vaccin contenant la valence coquelucheuse devra être évaluée soigneusement :
  - a une maladie non contrôlée ou une maladie grave touchant le cerveau (troubles neurologiques non contrôlés) ou souffert d'une épilepsie non contrôlée.
  - convulsions avec ou sans fièvre, survenant dans les trois jours après la vaccination.
  - a présenté précédemment un syndrome de Guillain-Barré (inflammation temporaire des nerfs provoquant une douleur, une paralysie et des troubles de la sensibilité) ou une neuropathie du pleus brachial (douleur sévère et réduction de la mobilité du bras et de l'épaule) après avoir reçu un vaccin contenant de l'anatoxine tétanique (une forme inactivée de la toxine du tétanos). Dans ce cas, la décision d'administrer de nouveau un vaccin contenant de l'anatoxine tétanique devra être évaluée par votre médecin.
- suit actuellement un traitement qui supprime son système immunitaire (les défenses naturelles du corps) ou si votre enfant souffre d'une maladie qui affaiblit son système immunitaire. Dans ce cas, la réponse immunitaire vis-à-vis du vaccin peut être diminuée. Il est alors habituellement recommandé d'attendre la fin du traitement ou de la maladie pour vacciner. Les enfants présentant une immunodéficience de longue durée, telle qu'une infection par le VIH (SIDA), peuvent toutefois recevoir HEXAXIM même si la protection dont ils bénéficieraient peut ne pas être aussi bonne que celle observée chez les enfants dont le système immunitaire est normal.
- souffre d'une maladie aiguë ou chronique, dont l'insuffisance ou la défaillance rénale chronique (incapacité des reins à fonctionner correctement).
- souffre d'une maladie du cerveau non diagnostiquée ou d'une épilepsie non contrôlée. Votre médecin évalue la bénéfice potentiel d'une vaccination.
- a, après des blessures mineures, des problèmes sanguins provoquant facilement des bleus et des saignements qui durent longtemps. Votre médecin vous dira s'il est souhaitable que votre enfant reçoive HEXAXIM.

**Autres médicaments ou vaccins et HEXAXIM**

Informez votre médecin ou infirmier/ère si votre enfant prend, a récemment pris ou pourrait prendre d'autres médicaments ou vaccins.

HEXAXIM peut être administré en même temps que d'autres vaccins, tels que les vaccins pneumocoquiques polyséviduels conjugués, vaccins rougeole-oreillons-rubéole, vaccins rotavirus ou les vaccins méningocoquiques.

Lorsqu'il est administré en même temps que d'autres vaccins, HEXAXIM sera administré à des sites d'injections différents.

**3. Comment utiliser HEXAXIM ?**

HEXAXIM sera administré à votre enfant par un médecin ou un(e) infirmier/ère formés à l'utilisation des vaccins et équipés pour la prise en charge des cas, peu fréquents, de réaction allergique grave suivant après l'injection (voir rubrique 4 « Effets indésirables éventuels »).

HEXAXIM administré en injection dans un muscle (voir intramusculaire (IM)) du haut de la cuisse ou du bras de votre enfant. Le vaccin ne sera jamais administré dans un vaisseau sanguin ou sous la peau.

*Se référer à la notice pour plus de détails.*

**Première série de vaccinations (immunocompétence)**

Vous enfant recevra soit deux injections espacées de deux mois, soit trois injections espacées d'un à deux mois (interalle de au moins 4 semaines entre chaque injection). Ce vaccin doit être utilisé conformément au calendrier de vaccination local.

*Se référer à la notice pour plus de détails.*

Après la première série de vaccinations, votre enfant devra recevoir une dose de rappel, conformément à la réglementation locale en vigueur, au moins 6 mois après la dernière dose de la série. Votre médecin vous dira quand cette dose devra être administrée.

**Si vous oubliez une dose d'HEXAXIM**

Si votre enfant manque une injection prévue, il est important que vous en discutiez avec votre médecin ou infirmier/ère. Il (elle) décidera du moment auquel la dose manquante doit être administrée.

Il est important de suivre les instructions du médecin ou de l'infirmier/ère afin que votre enfant termine sa série d'injections. Dans le cas contraire, il risque de ne pas être complètement protégé contre les maladies.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce vaccin, adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce vaccin peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Reactions allergiques graves (réaction anaphylactique)**

Si l'un de ces symptômes survient alors que votre enfant a déjà quitté l'endroit où il a reçu son injection, vous devez IMMÉDIATEMENT consulter un médecin :

- une difficulté à respirer

Le HEXAXIM should not be mixed with other medicinal products.

- une éruption cutanée
- un gonflement du visage ou du cou
- un malaise soudain et grave avec une baisse de la pression artérielle entraînant des sensations vertigineuses et perte de conscience, accélération du rythme cardiaque associée à des troubles respiratoires.

Lorsque ces signes ou symptômes (signes ou symptômes d'une réaction anaphylactique) surviennent, ils se développent en général rapidement après l'injection et alors que l'enfant se trouve encore à l'extérieur ou au cabinet du médecin.

Dés réactions allergiques graves, bien que rares (touchant jusqu'à 1 personne sur 1 000), peuvent survenir après cette vaccination.

**Autres effets indésirables**

Si votre enfant présente l'un des effets indésirables décrits ci-dessous, veuillez en informer votre médecin, votre infirmier/ère ou votre pharmacien.

- Effets indésirables très fréquents (pouvant toucher plus de 1 personne sur 10 ):
  - perte d'appétit (anorexie) - pleurs
  - sommolence
  - vomissements
  - douleur, rougeur ou gonflement au site d'injection
  - irritabilité
  - fièvre (température de 38°C ou plus)
- Effets indésirables fréquents (pouvant toucher jusqu'à 1 personne sur 10 ):
  - diarrhée
  - dérèglement au site d'injection (induration)
- Effets indésirables peu fréquents (pouvant toucher jusqu'à 1 personne sur 100 ):
  - malaise aiguë
  - boule (nodule) au site d'injection
  - forte fièvre (39,6°C ou plus)
- Effets indésirables rares (pouvant toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000 ):
  - Éruption cutanée
  - Larges réactions au point d'injection, supérieures à 5 cm, avec un gonflement du membre pouvant s'étendre jusqu'au articulations de chaque côté du point d'injection. Ces réactions apparaissent 24 à 72 heures après la vaccination et peuvent être associées à des symptômes de type rougeur, chaleur, sensibilité ou douleur au site d'injection. Elles disparaissent en 3 à 5 jours sans traitement.
  - Convulsions avec ou sans fièvre.
- Effets indésirables très rares (pouvant toucher jusqu'à 1 personne sur 10 000 ):
  - Pertes auditives bilatérales (perte de l'ouïe) survenant sans raison apparente en état de choc ou est palé, ne réagit pas, (hypotonie ou épisodes d'hypotone/hypertativité), EHH).

**Effets indésirables potentiels**

D'autres effets indésirables, non mentionnés ci-dessus, ont été rapportés occasionnellement avec d'autres vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, l'hépatite B ou des vaccins Hib et non directement avec HEXAXIM.

Une inflammation temporaire des nerfs provoquant des troubles sensoriels ou une faiblesse dans les membres (syndrome de Guillain-Barré) ou une douleur sévère et réduction de la mobilité du bras et de l'épaule) après avoir reçu un vaccin contenant de l'anatoxine tétanique (une forme inactivée de la toxine du tétanos) et de la pertussis, la décision d'administrer de nouveau un vaccin contenant de l'anatoxine tétanique devra être évaluée par votre médecin.

- Une inflammation de plusieurs nerfs provoquant des troubles sensoriels ou une faiblesse dans les membres (polyradiculonévrite) ou une paralysie locale, des troubles visuels, une baisse ou une perte soudaine de la vision (névrite optique), une maladie inflammatoire du cerveau et de la moelle épinière (démyélinisation du système nerveux central, sclérose en plaques) ont été rapportés après administration d'un vaccin hépatite B.
- Un gonflement ou une inflammation du cerveau (encéphalopathie/encéphalite).
- Chez les nourrissons très grands prématurés (à 28 semaines de grossesse ou moins) des pauses respiratoires peuvent survenir pendant 2 à 3 jours après la vaccination.

Conformes à un des deux pieds ou membres inférieurs, pouvant s'accompagner d'une coloration bléaeté de la peau (cyanose), de rougeurs, ou de petites taches de sang sous la peau (purpura transitoire) et de pleurs sévères, survenant généralement après les premières injections (primovaccination) par un vaccin contenant la valence coquelucheuse type b.

HEXAXIM se présente sous forme de suspension injectable en seringue préremplie (0,5 mL).

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées, troublé.

Ne pas utiliser les virus intradermique ou intraveineux. Ne pas injecter par voie intravasculaire : s'assurer que l'aiguille ne pénètre pas dans un vaisseau sanguin.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.

HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 1 aiguille séparée. HEXAXIM est disponible en boîte de 1 ou 10 seringues préremplies avec 2 aiguilles séparées.